



Εταιρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
boscalid 26,7% β/β, pyraclostrobin 6,7% β/β

COBALT

NEO

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των спорίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη спорιογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής - Μείγνους Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά: i) Για Μονίλια με 60-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-75 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., ii) Για Ωίδιο με 60 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται από την έναρξη της άνθησης έως την πώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών.

Κερασιά: i) Για Μονίλια με 60-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-75 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., ii) Για Ωίδιο με 60 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται από την έναρξη της άνθησης έως την πώση των πετάλων.

Φράουλα (Θ)*: i) Για Βοτρυτή με 135-150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 135-150 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., ii) Για Ωίδιο με 75-100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75-100 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημέρες εφόσον απαιτείται από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών.

Καρτότο (Υ)*: i) Για Ωίδιο με 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-80 γρ. σε 80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., ii) Για Αλτερνάρια με 70 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-80 γρ. σε 80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Τομάτα (Υ +Θ)*, Πιπεριά (Υ+Θ)*: Για Βοτρυτή & Ωίδιο με 100-150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται με την έναρξη των ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής.

Μαρούλι (Υ)*: Για Βοτρυτή & Σκληρωτίνια με 120-150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-75 γρ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Σπαράγγι: Για Σκωρίαση με 75-100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75-100 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος.

Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ): Για Βοτρυτή & Περονόσπορο με 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους.

Αμυγδαλιά: Για Μονίλια & Εξώασκο με 67-100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.

Φιστικιά: Για Καμαροσπόριο με 50-100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75-100 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες εφόσον απαιτείται από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.

Κουκιά (φρέσκα) Υ, Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ): Για Βοτρυτή, Σκληρωτίνια & Σκωρίαση με 100-385 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθησης.

Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ): Για Ασχοχύτωση, Ωίδιο, Περονόσπορο,

Σκληρωτίνια με 100-385 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Σπανάκι: Για Ανθράκνωση, Περονόσπορο, Κλαδοσπόριο με 75-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75-100 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται από την εμφάνιση του 4ου φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος.

Βασιλικός (Θ): Για Σκληρωτίνια & Βοτρυτή με 150-375 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται από την εμφάνιση του 5ου φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού.

Καλλωπιστικά - Τριαντάφυλλο (Θ): Για Ωίδιο με 150-375 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80-150 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται από την εμφάνιση του 3ου φύλλου, μέχρι το τέλος της άνθησης.

Παρατηρήσεις: *Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση. 1) Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά. 2) Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές boscalid και pyraclostrobin, οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 7 και 11, αντίστοιχα κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: ● Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. ● Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές. ● Μείνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή μέχρις ότου στεγνωθεί το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στα κουκιά συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το βυτίο με νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις (ημέρες): Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 28. Καρτότο (Υ), Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ), Σπανάκι, Αρωματικά φυτά Βασιλικός (Θ): 14. Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Μαρούλι (Υ), Κουκιά (φρέσκα) (Υ), Φασόλια (με λοβό και χωρίς λοβό) (φρέσκα) (Υ), Μπιζέλια (με λοβό και χωρίς λοβό - αρακάς) φρέσκα (Υ): 7. Φράουλα (Θ), Τομάτα (Υ + Θ), Πιπεριά (Υ + Θ): 3. Σπαράγγι (Υ): Μη εφαρμόσιμο (>120 ημέρες). Καλλωπιστικά (Θ): Μη εφαρμόσιμο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 100gr / 150gr / 300gr / 500gr / 1Kg / 2Kg

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **NITROFARM ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

63

12/2025



www.nitrofarm.gr

info@nitrofarm.gr

Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —